

АФРИКАНСКАЯ ЧУМА СВИНЕЙ (АЧС): ПАМЯТКА НАСЕЛЕНИЮ

Клинические признаки заболевания*:

на коже внутренней поверхности бедер, на животе, шее, у основания ушей, на пяточке и хвосте становятся заметны красно-фиолетовые пятна

появляются отдышка, кашель, пропадает аппетит, усиливается жажда



у животных повышается температура до 42 градусов

отмечаются паралич задних конечностей и приступы рвоты

Заболевание передается:



непосредственно при прямом контакте здоровых и больных животных

опосредованно:



через зараженные вирусом корма, подстилку,



механически (транспортными средствами, при перемещении животных),



через продукты из свинины.

Меры профилактики:

ежедневный осмотр животных самостоятельно или с помощью ветврачей;
не приобретать корма и кормовые добавки неизвестного происхождения в неустановленных торговых местах;
не скармливать животным пищевые отходы и отходы, полученные после забоя свиней, производить утилизацию отходов в установленных местах;
не приобретать живых свиней, мясо и мясопродукты в неустановленных торговых точках, без ветеринарных сопроводительных документов;
вести борьбу с грызунами;
не допускать посещения личных подворий посторонними лицами.



АЧС (болезнь Монтегю) - контагиозное вирусное заболевание домашних и диких свиней. Вакцины нет. Почти все поголовье заболевших свиней погибает. Животные с подозрением на заболевание уничтожаются.
АЧС не представляет опасности для здоровья людей.

** От заражения до появления клинических признаков проходит 2-7 дней. Смерть наступает на 1-й-5-й день, реже - позднее.*

ЭКСТРЕННАЯ ДОВРАЧЕБНАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ОТРАВЛЕНИИ ЖИВОТНОГО

СО СЛЕДУЮЩИМИ СИМПТОМАМИ:

- **Судороги** (запрокидывает голову назад, перебирает лапами, "крутит велосипед", задние лапы вытягивает, челюсти сжаты)
- **Учащенное дыхание и сердцебиение**
- Морда - в слюне, взгляд - испуганный
- Возможно небольшое кровотечение из пасти

СРОЧНЫЕ МЕРЫ:

- **Противоядие - 10 мл витамина B6 5%** ввести внутримышечно, лучше – внутривенно
- **Глюкозы р-р 5% 200 мл + 6 мл витамина С** (добавить во флакон с глюкозой): ввести подкожно (между лопатками в холку) капельницей или 20-мл шприцем - 30-50 мл на 1 кг веса животного
- **Дексаметазон 0,4%**, ввести внутримышечно: **1 мл** – мелкому, **2 мл** - крупному животному

СРОЧНО ДОСТАВИТЬ ЖИВОТНОЕ В ВЕТКЛИНИКУ НА КАПЕЛЬНИЦУ

ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА:
(063) 70-556-34 vermost.dp.ua

ЭКСТРЕННАЯ ДОВРАЧЕБНАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ОТРАВЛЕНИИ ЖИВОТНОГО

СО СЛЕДУЮЩИМИ СИМПТОМАМИ:

- **Судороги** (запрокидывает голову назад, перебирает лапами, "крутит велосипед", задние лапы вытягивает, челюсти сжаты)
- **Учащенное дыхание и сердцебиение**
- Морда - в слюне, взгляд - испуганный
- Возможно небольшое кровотечение из пасти

СРОЧНЫЕ МЕРЫ:

- **Противоядие - 10 мл витамина B6 5%** ввести внутримышечно, лучше – внутривенно
- **Глюкозы р-р 5% 200 мл + 6 мл витамина С** (добавить во флакон с глюкозой): ввести подкожно (между лопатками в холку) капельницей или 20-мл шприцем - 30-50 мл на 1 кг веса животного
- **Дексаметазон 0,4%**, ввести внутримышечно: **1 мл** – мелкому, **2 мл** - крупному животному

СРОЧНО ДОСТАВИТЬ ЖИВОТНОЕ В ВЕТКЛИНИКУ НА КАПЕЛЬНИЦУ

ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА:
(063) 70-556-34 vermost.dp.ua

ЭКСТРЕННАЯ ДОВРАЧЕБНАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ОТРАВЛЕНИИ ЖИВОТНОГО

СО СЛЕДУЮЩИМИ СИМПТОМАМИ:

- **Судороги** (запрокидывает голову назад, перебирает лапами, "крутит велосипед", задние лапы вытягивает, челюсти сжаты)
- **Учащенное дыхание и сердцебиение**
- Морда - в слюне, взгляд - испуганный
- Возможно небольшое кровотечение из пасти

СРОЧНЫЕ МЕРЫ:

- **Противоядие - 10 мл витамина B6 5%** ввести внутримышечно, лучше – внутривенно
- **Глюкозы р-р 5% 200 мл + 6 мл витамина С** (добавить во флакон с глюкозой): ввести подкожно (между лопатками в холку) капельницей или 20-мл шприцем - 30-50 мл на 1 кг веса животного
- **Дексаметазон 0,4%**, ввести внутримышечно: **1 мл** – мелкому, **2 мл** - крупному животному

СРОЧНО ДОСТАВИТЬ ЖИВОТНОЕ В ВЕТКЛИНИКУ НА КАПЕЛЬНИЦУ

ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА:
(063) 70-556-34 vermost.dp.ua

ЭКСТРЕННАЯ ДОВРАЧЕБНАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ОТРАВЛЕНИИ ЖИВОТНОГО

СО СЛЕДУЮЩИМИ СИМПТОМАМИ:

- **Судороги** (запрокидывает голову назад, перебирает лапами, "крутит велосипед", задние лапы вытягивает, челюсти сжаты)
- **Учащенное дыхание и сердцебиение**
- Морда - в слюне, взгляд - испуганный
- Возможно небольшое кровотечение из пасти

СРОЧНЫЕ МЕРЫ:

- **Противоядие - 10 мл витамина B6 5%** ввести внутримышечно, лучше – внутривенно
- **Глюкозы р-р 5% 200 мл + 6 мл витамина С** (добавить во флакон с глюкозой): ввести подкожно (между лопатками в холку) капельницей или 20-мл шприцем - 30-50 мл на 1 кг веса животного
- **Дексаметазон 0,4%**, ввести внутримышечно: **1 мл** – мелкому, **2 мл** - крупному животному

СРОЧНО ДОСТАВИТЬ ЖИВОТНОЕ В ВЕТКЛИНИКУ НА КАПЕЛЬНИЦУ

ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА:
(063) 70-556-34 vermost.dp.ua